



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี มียุงลายเป็นพาหะนำโรค พบได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่



การรักษา



ให้ยาลดไข้ "พาราเซตามอล"
ห้ามใช้แอสไพริน



พยายามดื่มน้ำมากๆ หรือ
ดื่มเกลือแร่แทนน้ำเปล่า



ถ้ามีอาการปวดท้อง ชีบลง
กระสับกระส่าย มือเท้าเย็น
ไข้ลด ให้รีบนำส่ง รพ. ทันที

อาการ



ไข้สูงเฉียบพลัน
เมื่ออาหาร หน้าแดง
ปวดศีรษะ อาเจียน



มีผื่น จุดสีแดง
ขึ้นตามลำตัว แขน ขา
หรือถ่ายอุจจาระดำ



มีภาวะช็อกช่วงไข้ลด
มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว



ตบโศก มักกดเจ็บ
บริเวณชายโครงขวา

การป้องกัน

1. หากมีอาการ
นำส่งสัควรรีบ
พบแพทย์



2. ป้องกันยุงกัด

นอนในมุ้ง หรือตัดมุ้งลวด
ในบ้าน และทายากันยุง



3. ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

กำจัดภาชนะที่มีน้ำขัง
ใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ
และปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบ้านให้สะอาด



ไข้มัน เลือดออก

"เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะ"

อาการ



ไข้สูง
เฉื่อยเพลีย



หน้าแดง
มีผื่น



คลื่นไส้
อาเจียน
เบื่ออาหาร



อ่อนเพลีย
ปวดกล้ามเนื้อ



เลือดกำเดาไหล



เลือดออก
ตามไรฟัน



อาเจียน
เป็นเลือด



ถ่าย
เป็นเลือด



4 กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรง จากไข้เลือดออก



เด็กที่มีอายุ
ต่ำกว่า 5 ปี



ผู้สูงอายุ



ผู้ที่มี
โรคประจำตัว



ผู้ที่มี
ภาวะอ้วน